



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD SE HA INTENSIFICADO EN LA ZONA:

Brote de sarampión en Perú enciende preocupación en Chile por riesgo de llegada de casos importados desde la frontera norte

JUDITH HERRERA C.

La declaración de emergencia sanitaria por sarampión en Perú encendió las alertas en Chile debido al riesgo de propagación y al intenso flujo de personas entre ambos países. Según autoridades de Salud peruanas, actualmente existen 257 casos reportados de sarampión en Puno, situación que llevó al ministerio del área de ese país a reforzar brigadas de vacunación y desplegar medidas especiales para contener la propagación.

La preocupación para Chile radica en la alta capacidad de contagio del virus, y en el tránsito permanente de personas

por el norte del país. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y una persona infectada puede transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas.

En Chile, si bien el sarampión fue eliminado hace décadas gracias a las campañas masivas de vacunación, el Ministerio de Salud ha mantenido vigilancia epidemiológica ante el aumento global de casos.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explica que "hemos reforzado la vigilancia epidemiológica en toda la red de salud y, hace tres semanas, iniciamos una búsqueda activa en los

registros de urgencias de la Región de Arica y Parinacota para identificar casos con síntomas compatibles que no hayan sido detectados".

Detalla que el sarampión es "una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata en Chile, y lo más importante es que se puede prevenir con la vacuna, que está disponible gratuitamente en todos los consultorios públicos y privados en convenio con las seremis".

Eso sí, advierte que "lamentablemente, solo el 77% de los niños de tres años ha recibido la segunda dosis, cuando necesitamos llegar al 95% para proteger a toda la comunidad".

Allan Mix, director del Programa de Especialidad en Medicina de Urgencia de la U. Diego Portales, plantea que "el riesgo de casos importados en Chile hoy es real y moderadamente alto, especialmente en el norte del país. No significa que exista una transmisión comunitaria instalada, pero sí que las probabilidades de detectar casos importados han aumentado significativamente".

Christian Palavecino, académico de Medicina de la U. Central, comenta que una de las medidas que se podría aplicar es que "en los puntos de control fronterizo, por ejemplo, el complejo de Chacalluta, estén atentos respecto de personas



SEBASTIAN GUSTAVAS FARIAS ORTIZ

El 77% de los niños de tres años ha recibido la segunda dosis contra el sarampión.

que estén manifestando ciertas sintomatologías. Por ejemplo, la fiebre alta es uno de los elementos que más pueden acusar una infección activa. Además, existen ciertas manchas que aparecen en la piel y que pueden ser identificadas fácilmente".